

	レジメン名	投与量・投与スケジュール	投与間隔
腎がん	ニボルマブ2週毎	ニボルマブ240mg/body d1	2週毎
	ニボルマブ4週毎	ニボルマブ480mg/body d1	4週毎
	ニボルマブ2週毎+カボザンチニブ	ニボルマブ240mg/body d1, カボザンチニブ40mg d1-14	2週毎
	ニボルマブ4週毎+カボザンチニブ	ニボルマブ480mg/body d1, カボザンチニブ40mg d1-28	4週毎
	ペムブロリズマブ3週毎+レンバチニブ	ペムブロリズマブ200mg/body d1, レンバチニブ20mg d1-21	3週毎
	ペムブロリズマブ6週毎+レンバチニブ	ペムブロリズマブ400mg/body d1, レンバチニブ20mg d1-42	6週毎
	ペムブロリズマブ3週毎+アキシチニブ	ペムブロリズマブ200mg/body d1, アキシチニブ10mg/day d1-21	3週毎
	ペムブロリズマブ6週毎+アキシチニブ	ペムブロリズマブ400mg/body d1, アキシチニブ10mg/day d1-42	6週毎
	術後補助ペムブロリズマブ3週毎	ペムブロリズマブ200mg/body d1	3週毎
	術後補助ペムブロリズマブ6週毎	ペムブロリズマブ400mg/body d1	6週毎