

	レジメン名	投与量・投与スケジュール	投与間隔
大腸がん	BEV+mFOLFOX6	ベバシズマブ5mg/kg d1, オキサリプラチン85mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, bolus5FU400mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	PANI+mFOLFOX6	パニツムマブ6mg/kg d1, オキサリプラチン85mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, bolus5FU400mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	mFOLFOX6	オキサリプラチン85mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, bolus5FU400mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	BEV+FOLFIRI	ベバシズマブ5mg/kg d1, イリノテカン150mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, bolus5FU400mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	RAM+FOLFIRI	ラムシルマブ8mg/kg d1, イリノテカン150mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, bolus5FU400mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	PANI+FOLFIRI	パニツムマブ6mg/kg d1, イリノテカン150mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, bolus5FU400mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	FOLFIRI	イリノテカン150mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, bolus5FU400mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	BEV+mFOLFOXIRI	ベバシズマブ5mg/kg d1, イリノテカン150mg/m ² d1, オキサリプラチン85mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	mFOLFOXIRI	イリノテカン150mg/m ² d1, オキサリプラチン85mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	BEV+FTD/TPI	ベバシズマブ5mg/kg d1, 15, トリフルリジン/チピラシル70mg/m ² d1-5 d8-12	4週毎
	BEV+CAPOX	ベバシズマブ5mg/kg d1, オキサリプラチン85mg/m ² d1, カペシタビン2000mg/m ² d1-14	3週毎
	CAPOX	オキサリプラチン85mg/m ² d1, カペシタビン2000mg/m ² d1-14	3週毎
	SOX	オキサリプラチン130mg/m ² d1, S1 80mg/m ² d1-14	3週毎
	SIRB	ベバシズマブ5mg/kg d1, イリノテカン150mg/m ² d1, S1 80mg/m ² d1-14	3週毎
	BEV+IRI	ベバシズマブ5mg/kg d1, イリノテカン150mg/m ² d1	2週毎
	PANI+IRI	パニツムマブ6mg/kg d1, イリノテカン150mg/m ² d1	2週毎
	BEV+IRIS	ベバシズマブ5mg/kg d1, 15, イリノテカン150mg/m ² d1, 15, S1 80mg/m ² d1-14	4週毎
	ENCO+CET	セツキシマブ初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² d1, 8, 15, 22, エンコラフェニブ300mg/body d1-28	4週毎
	ENCO+BINI+CET	セツキシマブ初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² d1, 8, 15, 22, エンコラフェニブ300mg/body d1-28, ビニメチニブ90mg/body d1-28	4週毎
	ENCO+CET2週毎	セツキシマブ500mg/m ² d1, 15, エンコラフェニブ300mg/body d1-28	4週毎
ENCO+BINI+CET2週毎	セツキシマブ500mg/m ² d1, 15, エンコラフェニブ300mg/body d1-28, ビニメチニブ90mg/body d1-28	4週毎	