

	レジメン名	投与量・投与スケジュール	投与間隔
胃がん	SOX	オキサリプラチン130mg/m ² d1, S1 80mg/m ² d1-14	3週毎
	CAPOX	オキサリプラチン85mg/m ² d1, カペシタビン2000mg/m ² d1-14	3週毎
	mFOLFOX6	オキサリプラチン85mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, bolus5FU400mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	S1+ドセタキセル(術後)	ドセタキセル40mg/m ² d1, S1 80mg/m ² d1-14	3週毎
	トラスツズマブ+SOX	トラスツズマブ初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg d1, オキサリプラチン130mg/m ² d1, S1 80mg/m ² d1-14	3週毎
	トラスツズマブ+weekly nabPTX	トラスツズマブ初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg d1, アルブミン懸濁型パクリタキセル100mg/m ² d1, 8, 15	4週毎
	RAM+weekly PTX	ラムシルマブ8mg/kg d1, 15, パクリタキセル80mg/m ² d1, 8, 15	4週毎
	RAM+weekly nabPTX	ラムシルマブ8mg/kg d1, 15, アルブミン懸濁型パクリタキセル100mg/m ² d1, 8, 15	4週毎
	RAM単独	ラムシルマブ8mg/kg d1	2週毎
	Weekly nabPTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル100mg/m ² d1, 8, 15	4週毎
	Weekly PTX	パクリタキセル80mg/m ² d1, 8, 15	4週毎
	SP-SH法	シスプラチン60mg/m ² d8, S1 80mg/m ² d1-21	5週毎
	Biweekly IRI	イリノテカン150mg/m ² d1, 15	4週毎
	NIVO2週毎	ニボルマブ240mg d1	2週毎
	NIVO4週毎	ニボルマブ480mg d1	4週毎
	NIVO+SOX	ニボルマブ360mg d1, オキサリプラチン130mg/m ² d1, S1 80mg/m ² d1-14	3週毎
	NIVO+FOLFOX	ニボルマブ240mg d1, オキサリプラチン85mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, bolus5FU400mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	初回ZOL+FOLFOX	ゾルベツキシマブ800mg/m ² d1, オキサリプラチン85mg/m ² d2, l-LV200mg/m ² d2, bolus5FU400mg/m ² d2, civ5FU2400mg/m ² d2(46h)	2週毎
	2コース以降ZOL+FOLFOX	ゾルベツキシマブ400mg/m ² d1, オキサリプラチン85mg/m ² d1, l-LV200mg/m ² d1, bolus5FU400mg/m ² d1, civ5FU2400mg/m ² d1(46h)	2週毎
	初回ZOL+CAPOX	ゾルベツキシマブ800mg/m ² d1, オキサリプラチン85mg/m ² d2, カペシタビン2000mg/m ² d2-15	3週毎
2コース以降ZOL+CAPOX	ゾルベツキシマブ600mg/m ² d1, オキサリプラチン85mg/m ² d1, カペシタビン2000mg/m ² d1-14	3週毎	
ペムブロリズマブ+トラスツズマブ+SOX	ペムブロリズマブ200mg/body d1, トラスツズマブ初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg d1, オキサリプラチン130mg/m ² d1, S1 80mg/m ² d1-14	3週毎	